



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

## VACUNACIÓN FRENTE AL MENINGOCOCO ACWY (NIMENRIX) EN JOVENES DE 15 Y 16 AÑOS

### Enfermedad meningocócica

La enfermedad meningocócica es una enfermedad grave, de declaración obligatoria ur-gente considerada una alerta de salud pública.

Está causada por el agente infeccioso: Neisseria meningitidis, del que se han identificado 13 serogrupos.

El reservorio es el ser humano, se transmite de forma directa de persona a persona por secreciones de la vía respiratoria y tras un contacto estrecho y prolongado.

El periodo de incubación varía entre 2 y 10 días, pero habitualmente es de 3-4 días, con una tasa de letalidad elevada y graves secuelas.

### Síntomas

Se presenta de forma aguda con manifestaciones clínicas que pueden ser muy variadas, las más comunes son la meningitis y la sepsis. Otras presentaciones menos frecuentes son la neumonía, artritis séptica, pericarditis, uretritis y conjuntivitis.

Suele tener un comienzo brusco, con fiebre, cefalea intensa, náuseas, vómitos, rigidez de nuca. La infección meningocócica puede limitarse a la nasofaringe, produciendo síntomas locales, o puede progresar a enfermedad invasora y producir un cuadro de púrpura fulminante con postración súbita y shock.

### ¿Cual es el estado actual de la enfermedad meningocócica?

En Andalucía, la enfermedad meningocócica invasiva presenta una incidencia de **0,87 casos por 100.000 habitantes**, (73 casos en el periodo 2018-2019), con una **mortalidad del 17.8%**. Presenta una tasa de **secuelas permanentes en torno al 30%**. Los datos en el resto de España son similares.

Puede afectar a cualquier edad, **siendo en la infancia y en la adolescencia donde se observa una mayor incidencia**.





## ¿Por qué se inicia una campaña de vacunación frente al meningococo ACWY en adolescentes?

En los últimos 5 años se ha producido un **aumento progresivo de casos** por meningococos del tipo W e Y, en algunos casos de especial virulencia y rápida expansión que elevó la letalidad en temporadas pasadas hasta el 30% en el conjunto del país.

En la franja de edad entre **15 y 19 años se registra habitualmente un aumento de incidencia** y una mayor tasa de portadores faríngeos de meningococos durante la adolescencia, sirviendo de vehículo de diseminación al resto de la población.

El 1 de enero de 2020 se inició una campaña de vacunación de 3 años de duración, con la población con edad entre 13 y 18 años (inclusive) con la vacuna del meningococo ACWY (Nimenrix). Así, cada año, durante 3 años consecutivos, se vacunará a las personas conforme vayan cumpliendo 15 años o 18 años.

La fecha prevista de fin de la campaña será el 31 de diciembre 2022.

Ruego pidan cita (nacidos entre 01/01/2005 hasta 31/12/2006) para la vacunación **en su centro de salud correspondiente**.

Teléfono cita previa para **Centro de Salud Ronda Histórica** indicando que es vacuna **NIMENRIX**:

**955001800**

**955001803**

La inmunización se realiza mediante una inyección intramuscular. El lugar de inyección recomendado es el músculo deltoides.

Para ampliar esta información, recomendamos la lectura de los documentos disponibles en <https://www.andavac.es/campanas/meningitis/>